



SITUACIÓN DE LOS CULTIVOS EN LA REGION NORTE DE TAMAULIPAS

18 de Abril de 2009

Ribereña-Reynosa y Reynosa San Fernando

EL CULTIVO DE MAIZ EN LA ZONA RIBEREÑA SE ENCUENTRA ENTRE LA ETAPA DE HOJA BANDERA A FLORACION. EN GENERAL SE OBSERVAN EN BUEN ESTADO Y CON BAJOS NIVELES DE INFESTACION DE PLAGAS TALES COMO LARVAS DE GUSANO COGOLLERO Y ELOTERO.

EN CUANTO AL ATAQUE DE ARAÑA ROJA SE ESTA OBSERVANDO UN LIGERO INCREMENTO EN LA PRESENCIA DE ESTA ACARO EN LOS CULTIVOS, SIN EMBARGO EN GENERAL NO ESTA CAUSANDO DAÑOS EN FOLLAJE YA QUE NO SE HA DISEMINADO EN TODA LA REGION. EN SU MAYORIA ESTAN APLICANDO EL SEGUNDO RIEGO DE AUXILIO.

EL CULTIVO DE SORGO EN EL AREA DE TEMPORAL SE ENCUENTRA EN LAS ETAPAS DE GRANO LECHOSO EN LA PARTE NORTE (MUNICIPIO DE REYNOSA), Y GRANO MASOSO A MADUREZ FISIOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO.

SE OBSERVA QUE LA SEQUIA ESTA PROBOCANDO ESTRES EN LAS PLANTAS Y SE ESTAN SECANDO LAS HOJAS INFERIORES Y EN ALGUNAS AREAS LA MUERTE PREMATURA DE LAS PLANTAS.

NO PRESENTAN RIESGOS FITOSANITARIOS IMPORTANTES QUE PONGAN EN RIESGO AL CULTIVO, YA QUE NO SE OBSERVAN PLAGAS AFECTANDOLO Y LA INFECCION DE ROYA SE CONSIDERA BAJA.

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS PRESAS DE LA REGIÓN

18 de Abril de 2009

CUENCA DEL BAJO RIO SAN JUAN

PRESA	ELEVACIÓN M/NM	VOLUMEN MMM3
EL CUCHILLO	163.84	1,323.959
LAS BLANCAS	89.43	77.804
MARTE R. GOMEZ	75.34	682.520

- AL DIA DE HOY SE ESTA EXTRAYENDO DE LA PRESA MARTE R. GOMEZ 59.2 m3/seg.
- SE ESTAN EXTRAYENDO 54.0.0 M3/SEG POR LA TOMA SUR Y 5.2 M3/SEG POR LA TOMA NORTE

SUPERFICIE REGADA

RIEGO No. 1		RIEGO No. 2		RIEGO No. 3	
DIARIA	ACUMULADA	DIARIA	ACUMULADA	DIARIA	ACUMULADA
105.90	68,627.30	1,516.20	43,993.20	1,539.70	8,928.40

RIO BRAVO-EMPALME-FCO. GONZALEZ VILLARREAL- SANTA APOLONIA- B E109

EN MAIZ LOS PRODUCTORES HICIERON APLICACIONES OPORTUNAS CONTRA GUSANO ELOTERO HAN TENIDO BUEN CONTROL. COMO DATO IMPORTANTE EXISTE UN LOTE DONDE DESDE HACE DOS SEMANAS SE HABIA DETECTADO HUEVECILLO DE ELOTERO Y EL PRODUCTOR NO TOMO ACCIONES DE CONTROL Y AHORITA YA EL GUSANO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA MAZORCA Y NO SE PUEDE EVITAR EL DAÑO.

EL 18 DE ABRIL EN RIO BRAVO Y REYNOSA LLOVIO EN ALGUNAS AREAS HASTA 2 PULGADAS, POR LO QUE AYUDO MUCHO PARA EL CONTROL PRINCIPALMENTE DE ARAÑA ROJA, NO ASI PARA EL GUSANO POR LO QUE LOS PRODUCTORES DEBERAN HACER APLICACIONES PARA EL CONTROL DE GUSANO ELOTERO Y COGOLLERO, EN EL CASO DEL SORGO PRINCIPALMENTE EN EL AREA DE TEMPORAL LAS LLUVIAS QUE SE REGISTRARON EN ALGUNAS AREAS SON DE SUMA IMPORTANCIA PARA EL LLENADO DEL GRANO, AUNQUE LOS PRODUCTORES DEBERAN ESTAR ATENTOS POR LA PRESENCIA DE GUSANO ELOTERO EN LA PANOJA.

ES MUY PROBABLE QUE EN ALGUNAS AREAS, TANTO DE RIEGO COMO DE TEMPORAL CUANDO INICIO LA LLUVIA EL SABADO CAYO GRANIZO, POR LO QUE LOS PRODUCTORES DEBERAN DAR AVISO A LAS ASEGURADORAS PARA QUE VERIFIQUEN EL CULTIVO.