



SITUACIÓN DE LOS CULTIVOS EN LA REGION NORTE DE TAMAULIPAS

25 de Mayo de 2009

Ribereña-Reynosa y Reynosa San Fernando

EL CULTIVO DE MAIZ EN LA ZONA RIBEREÑA SE ENCUENTRA ENTRE LA ETAPA DE GRANO DENTADO A MADUREZ FISIOLÓGICA.

EN GENERAL EL CULTIVO SE OBSERVA EN BUEN ESTADO, LA INFESTACION DE LARVAS DE ELOTERO YA SALIO A PUPAR Y DONDE SE ENCUENTRA PRESENTE SON LARVAS DE ÚLTIMO ESTADÍO.

SE OBSERVA MUY POCOS DAÑOS DE LARVAS DE GUSANO BARRENADOR, PERO YA NO SE ENCONTRARON LARVAS DAÑANDO LOS TALLOS Y LA BASE DE LAS MAZORCAS.

EL ATAQUE DE ARAÑA ROJA NO SE HA INTENSIFICADO Y EN GENERAL PRESENTA UNA BAJA INCIDENCIA.

SE ESTA CONCLUYENDO LA APLICACIÓN DEL TERCER RIEGO DE AUXILIO.

COMO CONCLUSION PARA EL CULTIVO DE MAÍZ, A LA FECHA NO PRESENTA RIESGOS FITOSANITARIOS QUE PUDIERAN PONER EN RIESGO UNA REDUCCION EN LOS RENDIMIENTOS, MISMOS QUE SE ESPERAN SEAN ALTOS.

EL CULTIVO DE SORGO EN EL AREA DE TEMPORAL SE ENCUENTRA EN SU MAYORÍA EN ETAPA DE GRANO EN MADUREZ FISIOLÓGICA Y ETAPA DE TRILLA EN LA PARTE NORTE (MUNICIPIO DE REYNOSA), Y EN ETAPA DE TRILLA EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO.

SE GENERALIZO LA LABOR DE TRILLA EN EL AREA DE REYNOSA.

ESTA POR CONCLUIR LA LABOR DE TRILLA EN EL AREA DE SAN FERNANDO, MISMA QUE SE LLEVA UN GRAN AVANCE.

LAS PRODUCCIONES DE GRANO QUE SE ESTAN COSECHANDO SE CONSIDERAN BUENAS (DE 2 A 3 TONELADAS).

RIO BRAVO-EMPALME-FCO. GONZALEZ VILLARREAL- SANTA APOLONIA- B E109

ESTE MUESTREO SE REALIZO EL 24 DE MAYO

EN LOS PUNTOS DE MUESTREO SE ENCONTRARON QUE EN ALGUNOS DE ELLOS HABIA LLOVIDO, ESTO ORIGINO QUE LOS PRODUCTORES PRINCIPALMENTE LOS QUE TIENEN SORGO YA MADURO INICIARAN LA RECOLECCION, ACTUALMENTE EN EL AREA DEL TEMPORAL SE LLEVA UN AVANCE DE UN 50% DE SUPERFICIE COSECHADA POR LO QUE EN LOS PROXIMOS 10 DIAS ES MUY PROBABLE QUE SE ALCANCE A RECOLECTAR EL 100%.

EN EL SORGO DE RIEGO ALGUNOS PRODUCTORES YA INICIARON LA RECOLECCION DE SUS COSECHAS. PERO HAY SORGOS QUE ESTAN TERMINANDO DE FLOREAR O EN GRANO LECHOSO TODAVIA, ESTOS SORGOS YA SE LES HA DADO UNA APLICACION PARA LA MOSQUITA MIDGE Y PARA CHINCHE CAFE Y GUSANO ELOTERO Y TELARAÑERO, POR LO QUE ES MUY PROBABLE QUE SE DE OTRA APLICACION PARA DICHAS PLAGAS EN LOS SORGOS QUE AUN ESTAN FLOREANDO Y EN GRANO LECHOSO, ESTOS SORGOS YA SE LES DIO EL 2do. RIEGO DE AUXILIO AL IGUAL QUE A LOS MAICES QUE SEMBRARON EN LAS ULTIMAS FECHAS SE LES ESTA DANDO EL 3er. RIEGO DE AUXILIO.

LOS MAICES QUE SE SEMBRARON EN LAS PRIMERAS FECHAS PRESENTAN EL FOLLAJE YA SECANDOSE POR LO QUE ESTO SIGNIFICA QUE SE ESTA LLEGANDO A

SU MADUREZ FISIOLÓGICA POR LO QUE ES MUY PROBABLE QUE ALGUNOS PRODUCTORES INICIEN LA RECOLECCIÓN DE SUS MAÍCES.