



## SITUACIÓN DE LOS CULTIVOS EN LA REGION NORTE DE TAMAULIPAS

18 de Mayo de 2009

---

### Ribereña-Reynosa y Reynosa San Fernando

---

**EL CULTIVO DE MAIZ EN LA ZONA RIBEREÑA SE ENCUENTRA ENTRE LA ETAPA DE GRANO MASOSO A GRANO DENTADO.**

EN GENERAL EL CULTIVO SE EN CUENTRA EN BUEN ESTADO Y PRESENTA INFESTACION BAJA DE LARVAS DE GUSANO ELOTERO EN LAS PUNTAS DE LOS ELOTES, SE OBSERVA QUE ESTA PLAGA ESTÁ EN SUS ÚLTIMOS ESTADÍOS Y EN SU MAYORÍA ESTA SALIENDO DE LAS MAZORCAS A PUPAR.

SE OBSERVA MUY BAJA PRESENCIA DE LARVAS DE GUSANO BARRENADOR DAÑANDO LA BASE DE LAS MAZORCAS.

EL ATAQUE DE ARAÑA ROJA NO SE HA INTENSIFICADO Y EN GENERAL PRESENTA UNA BAJA INCIDENCIA, Y CON LAS PRECIPITACIONES DEL FIN DE SEMANA ESPERAMOS QUE ASI CONTINUE.

**SE ESTA APLICANDO EL TERCER RIEGO DE AUXILIO.**

COMO CONCLUSION PARA EL CULTIVO DE MAÍZ, A LA FECHA NO PRESENTA RIESGOS FITOSANITARIOS QUE PUDIERAN PONER EN RIESGO UNA REDUCCION EN LOS RENDIMIENTOS, MISMOS QUE SE ESPERAN SEAN ALTOS.



EL CULTIVO DE SORGO EN EL AREA DE TEMPORAL SE ENCUENTRA EN SU MAYORÍA EN ETAPA DE GRANO EN MADUREZ FISIOLÓGICA Y ETAPA DE TRILLA EN LA PARTE NORTE (MUNICIPIO DE REYNOSA), Y EN ETAPA DE TRILLA EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO.

SE HA GENERALIZADO LA LABOR DE TRILLA EN EL AREA DE SAN FERNANDO, MISMA QUE SE LLEVA UN GRAN AVANCE.

LAS TRILLAS FUERON INTERRUMPIDAS POR LAS LLUVIAS OCURRIDAS EL SABADO 16 DE MAYO.

LAS PRODUCCIONES DE GRANO QUE SE ESTAN COSECHANDO SE CONSIDERAN BUENAS (DE 2 A 3 TONELADAS).

NO PRESENTAN RIESGOS FITOSANITARIOS IMPORTANTES QUE PONGAN EN RIESGO AL CULTIVO, YA QUE NO SE OBSERVAN PLAGAS AFECTANDOLO.

## SITUACIÓN ACTUAL DE LAS PRESAS DE LA REGIÓN

18de Mayo de 2009

### CUENCA DEL BAJO RIO SAN JUAN

PRESA	ELEVACIÓN M/NM	VOLUMEN MMM3
EL CUCHILLO	163.05	1,217.486
LAS BLANCAS	89.18	74.753
MARTE R. GOMEZ	74.60	583.111

- **EXTRACCION DE LA PRESA MARTE R. GOMEZ**

1. TOMA NORTE	3.8 M <sup>3</sup> /SEG.
2. TOMA SUR	34.0 M <sup>3</sup> /SEG.
<b>TOTAL</b>	<b>37.8 M<sup>3</sup>/SEG.</b>

- **EXTRACCION DE LA PRESA EL CUCHILLO**

**74.292 M<sup>3</sup>/SEG.**

### SUPERFICIE REGADA DISTRITO DE RIEGO 026 "BAJO RÍO SAN JUAN"

RIEGO No. 1		RIEGO No. 2		RIEGO No. 3		RIEGO No. 4	
DIARIA	ACUMULADA	DIARIA	ACUMULADA	DIARIA	ACUMULADA	DIARIA	ACUMULADA
28.0	68,934.6	292.7	64,099.9	810.7	42,893.8	1,444.1	21,306.9

- **PRECIPITACIONES**

CD. MIER	20.3 mm.
MIGUEL ALEMAN	43.2 mm.
CAMARGO	38.1 mm.
DIAZ ORDAZ	43.0 mm.
REYNOSA	55.9 mm.
RIO BRAVO	10.4 mm.

COMALES (TOMA SUR)	44.5 mm.
TOMA NORTE	25.4 mm.
EL MORILLO	66.0 mm.

## **RIO BRAVO-EMPALME-FCO. GONZALEZ VILLARREAL- SANTA APOLONIA- B E109**

**DESARROLLO FISIOLÓGICO DEL MAÍZ. HAY MAÍCES DONDE SE APRECIA QUE EL FOLLAJE SE ESTÁ SECANDO, LO QUE INDICA LA MADUREZ FISIOLÓGICA DEL CULTIVO Y HAY MAÍCES EN EL CUAL EL DESARROLLO DEL GRANO SE ENCUENTRA EN ESTADO LECHOSO Y MASOSO LAS LLUVIAS QUE SE PRESENTARON EL SABADO 16 POR LA TARDE**



**Y NOCHE AYUDO A DISMINUIR LA PRESENCIA DE ARAÑA ROJA EN MAÍCES TIERNOS, ACTUALMENTE SE LE ESTÁ DANDO EL 3er. RIEGO DE AUXILIO, LAS LLUVIAS QUE SE PRESENTARON EN NUESTRA REGION FUERON MUY IRREGULARES. EN EL CASO DEL SORGO HAY SORGOS PROXIMOS A TRILLARSE Y HAY SORGOS QUE TODAVIA NO EMPIEZAN A FLOREAR, ESTOS SORGOS AL IGUAL QUE LOS QUE ESTAN EN ESTADO LECHOSO PRESENTAN PROBLEMAS DE INFESTACIONES FUERTES DE MOSQUITA MIDGE Y CHINCHE CAFE, GUSANO ELOTERO, GUSANO TELARAÑERO POR LO QUE LOS PRODUCTORES DEBERAN ESTAR ATENTOS EN SUS CULTIVOS Y HACER APLICACIONES PARA PODER CONTROLAR DICHA PLAGA EN EL CASO DEL TEMPORAL SE OBSERVA ALGUNOS LOTES QUE SE ESTAN COSECHANDO POR AREAS, YA QUE ES DONDE LES HA AFECTADO MAS LA SEQUIA. EN EL AREA DE GONZALEZ VILLAREAL SE OBSERVA ALGUNOS LOTES INICIANDO LA RECOLECCION POR LO QUE EN ESTA SEMANA DEBERA DE INTENSIFICARSE LA TRILLA DEL SORGO EN EL AREA DE TEMPORAL. EN ESTA AREA PRACTICAMENTE CASI NO LLOVIO..,**