



## SITUACIÓN DE LOS CULTIVOS EN LA REGION NORTE DE TAMAULIPAS

25 de abril de 2011

---

### Distrito de Riego 026 “Bajo Río San Juan”

---

El cultivo de maíz en el zona ribereña se encuentra en sus etapas entre floración y grano ampolla (jiloteo).

La infestación de araña roja en la zona ha seguido incrementándose y las aplicaciones aéreas de agroquímicos no pueden hacerse durante todo el día debido a los fuertes vientos que se han presentado.

Es necesario que el agricultor recuerde plaga al aumentar su infestación destruye el área foliar de las plantas de maíz y por consiguiente se reduce el rendimiento por eso es fundamental su control.

En algunas áreas se observan plantas acamadas, debido al ataque de gusano barrenador del tallo, este daño no es significativo ya que se observa en bajo porcentaje.

En cuanto a daños en jilotes ocasionados por larvas de elotero y cogollero se considera de baja a normal.

Se está aplicando el segundo riego de auxilio.

Con respecto al cultivo de sorgo aún se está aplicando el primer riego de auxilio, este cultivo se encuentra principalmente en la etapa de espigamiento y en relación a su estado fitosanitario se encuentra con buena sanidad ya que no presenta enfermedades ni plagas que pongan en riesgo una disminución en el rendimiento.

## SITUACIÓN ACTUAL DE LAS PRESAS DE LA REGIÓN

25 de ABRIL de 2011

### CUENCA DEL BAJO RIO SAN JUAN

PRESA	ELEVACIÓN M/NM	VOLUMEN MMM3
EL CUCHILLO	163.90	1,332.045
LAS BLANCAS	89.76	81.831
MARTE R. GOMEZ	75.52	675.987

### **EXTRACCION PRESA MARTE R. GOMEZ**

TOMA NORTE 5.2 M3/SEG

TOMA SUR 60.0 M3/SEG

**TOTAL: 65.2 M3/SEG**

### **SUPERFRICIE REGADA EN EL DISTRITO DE RIEGO 026 "BAJO RÍO SAN JUAN AL 24 DE ABRIL DE 2011.**

RIEGO 1 (ASIENTO)		RIEGO 2 (1er AUXILIO)		RIEGO 3 (2º. AUXILIO)		RIEGO 4 (3er AUXILIO)	
<i>Diaría</i>	<i>Acum.</i>	<i>Diaría</i>	<i>Acum.</i>	<i>Diaría</i>	<i>Acum.</i>	<i>Diaría</i>	<i>Acum.</i>
62.0	68,952.4	802.6	59,895.1	2,328.2	16,537.6		