



SITUACIÓN DE LOS CULTIVOS EN LA REGION NORTE DE TAMAULIPAS

Reporte al 26 de septiembre de 2011

Distrito de Desarrollo Rural 155 : Distrito de Riego 026 “Bajo Río San Juan” (Reynosa, Rio Bravo, Ribereña)

Siembras de tardío.- El cultivo de sorgo se encuentra desde la etapa de desarrollo 10 hojas, hasta las etapas de espigamiento y floración. Se observa fuerte infestación de larvas de gusano cogollero y elotero en el follaje, mas no así las espigas que están emergiendo y en floración no presentan ningún daño por plagas.

Al cultivo de maíz que se encuentra en etapa de desarrollo (8 hojas), se le aplicó recientemente insecticida para controlar infestación de gusanos cogollero y elotero, los predios que se encuentran en



etapa de grano lechoso (elote), presentan infestación de larvas de elotero en el elote, y también se observa un fuerte daño por depredadores (tejón), el cual esta acamando las plantas y dañando los elotes.



El cultivo de frijol continúa siendo afectado por larvas de pequeño barrenador y por enfermedades fungosas en la raíz, lo que está provocando una fuerte disminución de la densidad de población

Labores de preparación.- los agricultores continúan realizando la labor de rotura y los que ya tenían esa labor ya iniciaron con la labor de rastreo sobre la rotura.



SITUACIÓN ACTUAL DE LAS PRESAS DE LA REGIÓN

26 de SEPTIEMBRE de 2011

CUENCA DEL BAJO RIO SAN JUAN

PRESA	ELEVACIÓN M/NM	VOLUMEN MMM3
EL CUCHILLO	161.78	1,050.546
LAS BLANCAS	87.76	57.423
MARTE R. GOMEZ	75.52	675.987

EXTRACCION PRESA MARTE R. GOMEZ

TOMA NORTE	0.0 M ³ /SEG
<u>TOMA SUR</u>	<u>2.0 M³/SEG</u>
TOTAL:	2.0 M³/SEG